

ad 16. *X. basalis* Say ♂♀ ist schwarz, beim ♂ der Hinterleib pechschwarz, der Bauch heller, an den Seiten weisslich, beim ♀ die beiden ersten Segmente — (oder Segment 2 und 3?) — honiggelb; der Kopf mit gelben Zeichnungen, der polierte Scheitel wenigstens beim ♂ mit zwei schmalen gelben Streifen; die Fühler schwarzbraun, beim ♂ an der Basis gelbbraun, beim ♀ der Thorax mit bläulichem Schein; die Beine honiggelb, beim ♂ nur die Spitzen der Tarsen braun, beim ♀ die Hinterschienen und Tarsen schwarz, die ersteren mit weisser Basis; Flügel hyalin mit bräunlichem Stigma. — Länge 7—9 mm. — U. S. A.

Das Männchen wurde von Westwood unter dem Namen *X. Walshi* beschrieben.

ad 17. *X. maculata* Say ♂♀ ist schwarz mit reichlicher weisser Zeichnung; 2 Stirnflecke, 2 oder beim ♀ 4 Scheitelflecken, je ein Schläfenstreif und die innere Orbita gelblichweiss; Mandibeln und Palpen beim ♂ theilweise weiss, beim ♀ rot; beim ♂ das Mesonotum weiss gefleckt, beim ♀ der schmale Pronotumrand, die Vorderecken der Flügelschuppen und ein Mesopleurenfleck weiss; der Hinterleib mit weissen Seitenflecken und beim ♀ auch die Spitze des letzten Rückensegmentes weiss; die Beine honiggelb, beim ♀ bräunlichgelb, die Tarsen schwärzlich; am Kopf die Stirn gerunzelt, der Oberkopf poliert; die Fühler 18—19-gliedrig, beim ♂ in der Mitte weiss geringelt, beim ♀ weiss, an Basis und Spitze schwarz; die Flügel hyalin, beim ♀ die Spitzenhälfte schwach getrübt. — Länge 11—14 mm. — U. S. A.

Das ♀ beschrieb Th. W. Harris unter dem Namen *X. albicornis*.

ad 18. *X. Provancheri* Cress. ♂♀ ist ausgezeichnet durch den punktierten Oberkopf und dadurch der *X. orientalis* Westw. verwandt. Schwarz, die untere Orbita, ein manchmal fehlender Fleck auf dem Clypeus, zwei Scheitelflecken, jederseits ein kurzer Schläfenstreif, der Seitenrand des Pronotum und Seitenflecke am Hinterleibsrücken weiss; die Flügelschuppen und die Beine honiggelb, die Spitzen der Tarsen braun; die Flügel hyalin, das Stigma schwarz; Hinterleibsrücken an der Basis runzelig. — Länge 9—14 mm. — U. S. A.

4. Gen. *Konowia* Brauns.

Die Gattung wurde von meinem verehrten Freund dem Herrn Professor Brauns in der Wien. Ent. Zeitung 1884 p. 220 auf ein in der sogenannten Kalkhorst bei Neustrelitz

erbeutetes weibliches Exemplar gegründet, zu welchem sich seitdem ein gleiches Exemplar von St. Petersburg gesellt hat. Dieselbe ist in ihrem Habitus der vorigen sehr ähnlich; doch ist der Kopf verhältnismässig klein, kaum so breit wie der Thorax, und der Hinterleib ist an der Spitze etwas weniger verschmälert als bei *Xiphydria*.

Nur eine Art, die *K. Megapolitana* Brauns ♀ ist bekannt. Dieselbe ist ganz schwarz, ohne irgendwelche helle Zeichnung; die Beine pechschwarz; der Clypens in der Mitte in ein spitzes Zähnchen ausgezogen; die Stirn gerunzelt; der Oberkopf gleichfalls fein, nach hinten feiner gerunzelt, am Hinterrande ziemlich glatt; die Fühler 13-gliedrig, das zweite Glied $= \frac{2}{3}$ von 3 und dem vierten an Länge gleich; die Flügel sind leicht schwärzlich getrübt, die Hinterflügel etwas lichter; die Klauen sind über der Basis stumpf zahnartig erweitert; 8 mm lang.

III. Systematische Tabelle der Xiphydriini.

1. gen. *Derecyrtia* Smith.

1. *rugifrons* Cam. ♀ Biol. Centr. Am. P. 27. 1883.
Hymen. I. p. 68 Am. c. Costa Rica.
2. *lugubris* Westw. ♀ Thesaur. ent. Oxon. 1874 p. 122. Brasil.
3. *pictipennis* Smith ♀ Ann. and Mag. Nat. Hist. VI.
1860 p. 255 Brasil.
4. *flavipes* Phil. ♂ ♀ Stettin. entomol. Zeitg. 32. 1871
p. 287 Chili.
5. *Reedii* Kirby ♀ List of Hym. Brit. Mus. I. 1882
p. 368 Chili.

2. gen. *Brachyxiphus* Phil.

1. *grandis* Phil. ♀ Stettin. entomol. Zeitg. 32. 1871
p. 287 Chili.
- ? ♂ *hyalinus* Kirby 1882.

3. gen. *Xiphydria* Latr.

1. *rufipes* Smith ♀ Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III.
1858 p. 177 As. Aru-J.
2. *Camelus* L. ♂ ♀ Syst. nat. 1758 p. 560 . . . E. Sibir.
3. *scutellata* n. sp. ♂ Turkmen.
4. *picta* n. sp. ♂ ♀ Helvet. Ca.
5. *longicollis* Geoffr. ♂ ♀ Fourer. Entom. Paris. I. 1785
p. 378 E.
- Camelus* Rossi 1790.
- annulata* Jur. 1807.
- var. *pacca* F. ♀ Mantissa insect. 1787 n. 17 . Dania.

6. *prolongata* Geoffr. ♂♀ Fourcr. Entom. Paris. I. 1785
p. 379 E.
Dromedarius F. 1787.
fasciata Lep. 1823.
7. *funicornis* n. sp. ♀ Birmania.
8. *decepta* Smith ♂♀ Trans. ent. soc. London 1876, p.
474 et 1878, p. 1 Austral. N. Seeland.
♂ *flavopicta* Smith 1878.
9. *similis* F. ♀ Entom. syst. II. 1793 n. 18. Afr. Cap. b. s.
10. ? *Potanini* Jakowl. ♀ Horae soc. ent. Ross. 26. P. 1—
2, 1891 p. 15 China.
11. *orientalis* Westw. ♀ Thesaur. ent. Ox. 1874, p. 112.
India, Birm.
12. *cyanea* Mocs. ♀ Termesz. Füzet. 14. 1891, p. 158. Java.
13. *laeviceps* Smith ♀ Journ. of Proc. Linn. soc. Zool.
IV. 1860. Suppl. p. 137 Molucc.
14. *tibialis* Say ♀ Keating's Narrat. Exped. II. 1824. App.
p. 312 U. S. A. Canada.
mellipes Harris 1841.
Canadensis Prov. 1875.
15. *abdominalis* Say ♂♀ Keating's Narrat. Exped. II. 1824.
App. p. 311 U. S. A. Canada.
attenuata Nort. ♂ 1862.
rufiventris Cress. 1880.
16. *basalis* Say ♂♀ Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836,
p. 222 U. S. A.
Walshi Westw. 1874.
17. *maculata* Say ♂♀ Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836,
p. 221 U. S. A.
albicornis Harr. ♀ 1841.
18. *Provancheri* Cress. ♂♀ Trans. Amer. Ent. Soc. 8.
1880, p. 49 U. S. A.
Xiphidion Canadense Prov. 1875.

4. gen. *Konowia* Brauns.

1. *Megapolitana* Brauns ♀ Wien. ent. Zeitung 1884,
p. 220 Germ. Russ.

Ueber eine Farbenaberration von *Calosoma sycophanta* L.

Von Dr. K. M. Heller (Dresden).

Im Dresdner Zoologischen Museum befindet sich seit langer Zeit eine meines Wissens bisher unbeschriebene Farbenabänderung von *Calosoma sycophanta* L.¹⁾, die von dem verstorbenen Dr. Joh. Fr. A. Dehne²⁾ in der Lössnitz bei Dresden erbeutet wurde. Es ist ein grosses, weibliches Exemplar, von oberseits ganz tiefschwarzer Färbung; auch die Unterseite ist weniger bläulich wie bei normalen Stücken, die Seiten der Vorderbrust dagegen sind, wie gewöhnlich, blau und die Epipleuren metallisch grünlich. Kopf und Halsschild sind oben matt schwarz, ohne Spur eines bläulichen Schimmers, auch der grösste Theil der Flügeldecken ist so gefärbt, nur dem Seitenrand entlang ist bei genauerer Betrachtung ein schwacher Aufflug bemerkbar, der das 12.—15. Spatium bedeckt und schwärzlich grün, im Spitzenviertel sich bis auf den Seitenrand ausdehnt und daselbst etwas metallisch grün ist.

Während von *Calosoma inquisitor* L. alle Farbenabstufungen von hell broncegrün, broncebraun, bronceviolett bis schwarz allgemein bekannt und meist an einer Localität zugleich vorkommen, kennt man von *C. sycophanta* L., abgesehen von geringeren Abänderungen (wie z. B. das feurigere Rothgold der istrianer und dalmatiner Stücke), nur noch die als var. *severa* Chand. beschriebene Form, die oberseits ganz dunkel kupferbraun ist und „les possessions turques en Asie“, nach Ganglbauer aber auch Siebenbürgen bewohnt.

Ich habe das mir vorliegende Unicum, das 27 mm lang und 13.5 mm breit ist, analog der *C. inquisitor* var. *nigra* Letzn. in der Museumssammlung als aberratio *corvina* bezeichnet.

1) Nur v. Dalla Torre „Die Fauna von Helgoland“, Jena, 1889, erwähnt p. 55 bei *C. sycophanta*; schwarz: 2 mal.

2) Seiner entomologischen Excursionen gedenkt der Genannte in einer kleinen Schrift: *Micromys agilis*, Kleinmans, ein neues Säugethier der Fauna von Dresden. Hoflössnitz bei Dresden 1841. Daselbst wird auch eine Monstrosität von *Carabus nitens* mit doppeltem linken Vordertarsus erwähnt.

Gefälliger Beachtung empfohlen!

Den Mitarbeitern der „Entomologischen Nachrichten“ werden 30 Sonderdrucke ihrer Aufsätze gratis zugestellt.

Im Interesse pünktlicher Erledigung geben wir bekannt:

Das Abonnement auf die Ent. Nachrichten ist für das ganze Jahr zu entrichten.

Preis der Anzeigen: 30 Pfennig die durchlaufende Zeile.

Berlin, N W., Carlstrasse 11. R. Friedländer & Sohn.

R. FRIEDLÄNDER & SOHN IN BERLIN.

Neue Publicationen von

[74

Ch. Kerremans

über Buprestiden:

Contribution à l'étude de la Faune Intertropicale Américaine.

Voyage de M. E. Gounelle au Brésil.

Buprestides.

Bruxelles 1897. 146 pg. gr. in-8.

4 Mark.

Étude synonymique sur le genre Chrysochroa.

(Notes from the Leyden Museum 1897.) 18 pg. 8.

Mark 1,20.

Julodis Atkinsoni

a new species of (Buprestid) Beetle.

(Calcutta, Indian Museum Notes, 1896.) 2 pg. with illustrations. Imp.-8.

Mark 0,60.

Auch alle anderen Arbeiten von Ch. Kerremans sind vorrätig. —

In unserem Verlage erschien:

K. M. Heller

Erster Beitrag zur Papuanischen Käferfauna.

1893. 17 Seiten mit 4 Figuren. gross-4. — Preis 3 Mark.

Neue Käfer von Célebes

gesammelt von den Herren Dr. P. und Dr. F. Sarasin.

1896. 26 Seiten mit 1 Tafel, gross-4. — Preis 3 Mark.

Zygopiden-Studien

mit besonderer Berücksichtigung der Gattungen

Mecopus und Copturus.

2 Theile: 118 Seiten mit 2 Tafeln (101 Abbildungen) in gr. 4.

Preis 17 Mark.

(I. Mecopus: 8 Mark. II. Copturus: 9 Mark.)

internat. Entomol. Verein.

[75

Grösste Vereinigung aller Entomologen und Insektensammler der Welt!

Ca. 1000 Mitglieder in allen Ländern. Gemeinverständlich redigirte wissenschaftliche Zeitschrift. Zwei Centralstellen für den Umtausch der Doubletten; eigene Sammler in den Tropen.

Jährlicher Beitrag einschl. Zeitschrift nur 5 Mark. Eintrittsgeld 1 Mark.

Meldungen an den Vorsitzenden

M. Redlich, Guben.

Mémoires sur les Lépidoptères

rédigés par **N. M. Romanoff.**

[76]

Tome IX.

St. Petersbourg. 4. 365 pg. avec 44 planches coloriées. — Preis 48 Mark.

Inhalt:

Alphérak y, S., Lépidoptères rapportés par Mr. Gr. Groum-Grshimailo de l'Asie Centrale en 1889—1890. — Alphérak y, S., Lépidoptères des provinces chinoises Sé-Tchouen et Kham recueillis, en 1893, par Mr. G. N. Potanine. — Alphérak y, S., Lépidoptères de l'Amour et de la Corée. — Alphérak y, S., Mémoire sur différents lépidoptères, tant nouveaux que peu connus, de la faune paléarctique. — Alphérak y, S., Sur quelques Lépidoptères rapportés de l'Asie, en 1893—95, par l'expédition de Mrs. Roborowsky et Kozlov. — Herz, O., Reise von Jakutsk nach Kamtschatka im Jahre 1890. — Alphérak y, S., Lepidopteren aus Kamtschatka, gesammelt von O. Herz, bearbeitet von S. Alphérak y.

Früher erschienen:

Tome I. St. Petersbourg 1884. 4. 484 pg. avec 40 planches coloriées et 1 carte de la Transcaucasie. — Preis 30 Mark.

Inhalt: Romanoff, Les Lépidoptères de la Transcaucasie. I. partie. — Christoph, Lepidoptera aus dem Achal-Tekke-Gebiete. I. Theil. — Staudinger, Beitrag zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna des Achal-Tekke-Gebiets. — Snellen, In nouveau genre des Pyralides. — Grumm-Grshimailo, Lepidopterologische Mittheilungen. — Table alphabétique.

Tome II. St. Petersbourg 1885. 4. 262 pag. av. 16 planches coloriées. Preis 40 Mark.

Inhalt: Romanoff, Les Lépidoptères de la Transcaucasie. II. partie. Christoph, Lepidopteren aus dem Achal-Tekke-Gebiete. II. Theil. — Haylaerts, Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle appartenant aux Cossina H. S. — Haylaerts, Psychides nouvelles ou moins connues de l'Empire Russe. — Snellen, Description d'un nouveau genre de Pyralides. — Christoph, Schmetterlinge aus Nord-Persien. — Erschoff, Verzeichniss von Schmetterlingen aus Central-Sibirien. — Grumm-Grshimailo, Bericht über meine Reise in das Altai-Gebiet. (Correspondenz.) — Table alphabétique.

Tome III. St. Petersbourg 1887. 4. 449 pg. avec 47 planches coloriées et 2 cartes coloriées. — Preis 50 Mark.

Inhalt: Romanoff, Les Lépidoptères de la Transcaucasie. III. partie. — Christoph, Lepidoptera aus dem Achal-Tekke-Gebiete. III. Theil. — Staudinger, Neue Arten und Varietäten von Lepidopteren aus dem Amur-Gebiete. — Fixsen, Lepidoptera aus Korea. — Grumm-Grshimailo, Bericht über meine Reise in das östliche Bucharä. (Correspondenz.) Nebst Anhang: Diagnosen einiger neuen Species. — Alphérak y, S., Diagnoses de quelques Lépidoptères inédits du Thibet. — Table alphabétique.

Tome IV. St. Petersbourg 1890. 4. VII et 577 pg. avec 24 planches coloriées, 1 lithographie et une carte. — Preis 80 Mark.

Inhalt: Grumm-Grshimailo, Le Pamir et sa Faune Lépidopterologique.

Tome V. St. Petersbourg 1889. 4. 248 pg. avec 12 planches coloriées. Preis 40 Mark.

Inhalt: Christoph, Lepidoptera aus dem Achal-Tekke-Gebiete. IV. Theil. — Alphérak y, Lépidoptères rapportés du Thibet par le Général N. M. Przewalsky de son voyage de 1884—85. — Alphérak y, Lépidoptères rapportés de la Chine et de la Mongolie par G. N. Potanine. — Alphérak y, Le Pamir et sa Faune lépidoptérologique. Seconde Partie (spéciale) IV. Noctuelites. — Christoph, Neue Lepidopteren aus dem Kaukasus. — Alphérak y, Zur Lepidopteren-Fauna von Teneriffa. — Alphérak y, Sur quelques Lépidoptères de la Russie méridionale. — Table alphabétique.

Tome VI. St. Petersbourg 1892. 4. 700 pg. avec 16 planches coloriées. Preis 60 Mark.

Inhalt: Alphérak y, Lépidoptères rapportés de la Chine et de la Mongolie par G. N. Potanine. II. — Erschoff, Verzeichniss von Schmetterlingen aus Central-Sibirien. — Standfuss, Lepidopterologische. — Staudinger, Die Macrolepidopteren des Amurgebiets. I. — Table alphabétique.

Tome VII. St. Petersbourg 1893. 4. LVI et 638 pg. avec 23 planches dont 20 coloriées. — Preis 75 Mark.

Inhalt: Ragonot, Monographie des Phycitinae et des Gallerinae. Vol. I. Tome VIII enthaltend Ragonot, Monographie des Phycitinae et des Gallerinae. Vol. II. wird Ende 1897 erscheinen.

Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus,
herausgegeben von Dr. F. Karsch in Berlin.

Die Entomologischen Nachrichten erscheinen regelmässig am 1. und 15. jeden Monats. Der Preis des Jahrganges beträgt 6 Mark, oder, bei directer Franco-Versendung unter Kreuzband durch die Post für Deutschland und Oesterreich-Ungarn M. 7, für das Ausland (Welpostverein) M. 7,50 (7 sh. 6 d., 9 frs. 50 cent.). Auch nehmen alle in- und ausländischen Buchhandlungen und die Postanstalten Bestellungen entgegen.

Anzeigen für die durchlaufende Zeile 30 Pf. Beilagen bis zur Stärke von $\frac{1}{4}$ Bogen (4 Oktav-Seiten) 6 Mark; stärkere Beilagen unterliegen besonderer Vereinbarung.

Zuschriften, die Redaction betreffend, werden an Dr. F. Karsch in Berlin N.W., Birkenstr. 75, oder durch die Verlagshandlung erbeten; sonstige geschäftliche Mittheilungen sowie alles, was die Expedition betrifft, sind an die Verlagsbuchhandlung von R. Friedländer & Sohn in Berlin, N.W., Carlstr. 11 zu richten.

Inhalt von Nr. XXI.

Höppner, H., Ueber zwei unbekannte oder weniger bekannte Hummelnester	313
Kriechbaumer, Ein Parasit der seltenen Eupithecia Mil- lierata	316
Meier, W., Varietäten der Coccinellide: Hippodamia sep- temmaculata Degeer	317
Stein, Anthomyiden mit Lipa-ähnlich erweiterten Tastern	317
Vorbringer, G., Pterostichus glaber nov. spec.	323
Kleinere Mittheilungen	326
Litteratur	327

Berlin

R. Friedländer & Sohn.

N.W., Carlstr. 11.